

**[원료약품 및 그 분량] 1정 1099.345mg 중**

토코페롤아세테이트2배산(KPC)-----200g (비타민E로서 100IU)

β-카로틴10%(별규) ----- 42.960g

(β-카로틴으로서 7,160IU)

아스코르브산 과립90% (별규) -----125.556mg

(아스코르브산으로서 113mg)

산화제이구리 (KPC) ----- 0.501mg(구리로서 0.4mg)

산화아연(USP)----- 21.658mg(아연으로서 17.4mg)

첨가제(타르색소): 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF) 알루미늄 레이크, 적색 40호(알루라레드 AC, Allura Red AC) 알루미늄 레이크

**[성상]** 진한 오렌지색의 타원형 필름 코팅정

**[효능·효과]** 눈의 건조감의 완화, 야맹증, 말초혈행장애 및 갱년기시 증상의 완화 :

어깨·목결림수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)

**[용법·용량]** 성인 : 1일 1회 1정을 복용하거나, 의사의 지시에 따라 복용한다.

**[사용상의 주의사항]**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 8세 미만의 영아 (갓난아기)
- 3) 월슨씨병 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. : 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

- 1) 임부, 수유부, 미숙아, 유아에 대한 투여 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생)증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. (비타민A결핍증 환자는 제외)
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전·후에는 피할 것.
- 3) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의 한다.
- 4) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가 될 수 있다.
- 5) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기)등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 임상검사치에의 영향 : 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria: 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 3) 임수·수유부
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자

- 5) 신장애(신장장애) 환자
  - 6) 저단백혈증 환자
  - 7) 흡연자 :  $\beta$ -카로틴 투여와 흡연과 관련된 위험성에 대하여 상의 할 것
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.  
 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 구역, 구토, 위부불쾌감, 설사, 변비, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 혼수, 저혈압, 폐부종이 나타날 수 있다.
  - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아 질 수 있으며 출혈이 오래 지속 될 수 있다.
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법•용량을 잘 지킨다
  - 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
  - 3) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000IU이상을 넘지 않도록 한다.
7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
  - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**[포장단위]** 120정

**[사용기한]** 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

※ 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 ‘의약품등 정보’란을 참조하십시오.

※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품 안전청 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ [제품관련문의] 바슈롬 소비자상담실 080-080-3378

※ 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지 마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다.

**제조사**

Nutra Manufacturing Inc  
 1050 Woodruff Road Greenville,  
 South Carolina 29607  
 USA

**수입자**

바슈롬싸우스아시아인크(영업소)  
 서울시 강남구 테헤란로98길 8  
 KT&G 코스모대치타워 13층