

[원료약품 및 그 분량] 1mL 중

주성분: 염화나트륨 (USP) ----- 50 mg

보존제: 파라옥시안식향산메칠 (NF) ----- 0.23 mg

보존제: 파라옥시안식향산프로필 (NF) ----- 0.10

프로필렌글리콜 , 히드록시프로필메틸셀룰로오스2910, 붕산, 붕사, 수산화나트륨 , 염산 , 정제수

[성상] 백색 플라스틱 병에 무색투명한 액을 함유한 점안(눈에 넣음)제

[효능·효과] 각막부종(부기)의 일시적 완화.

[용법·용량] 증상이 있는 눈에 매 3~4시간마다 1~2방울씩 점안(눈에 넣음)한다. 또는 의사의 지시에 따라 점안(눈에 넣음)한다

[사용상의 주의사항]

1. 다음의 환자분의 경우에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

2. 의사의 지시나 감독 하에서만 사용되어야 합니다.

3. 눈의 통증, 시력변화, 지속적인 충혈이나 자극감을 경험하거나, 증상이 악화되거나 지속되면 의사와 상의하십시오.

4. 이 약의 오염을 피하기 위하여 용기의 팁이 외부에 닿지 않도록 하십시오.

5. 사용 후 뚜껑을 꼭 닫습니다.

6. 이 약은 점안(눈에 넣음)시 일시적인 화끈거림과 자극감이 생길 수 있습니다.

7. 만약 이 약의 색깔이 변했거나 혼탁(어지러움,흐림)해졌으면 사용하지 마십시오.

8. 실수로 이 약을 먹었을 경우, 즉시 전문가의 도움을 받으십시오.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의 하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 상온 (15~25℃) 보관

[포장단위] 15ml / 병

[사용기한] 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

※ 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 ‘의약품등 정보’란을 참조하십시오.

※ 의약품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품 안전청 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성정보 → 의약품유해사례보고)에 알리도록 하십시오.

※ [제품관련문의] 바슈롬 소비자상담실 080-080-3378

※ 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질,변패 또는 오염되었거나 손상된 제품인 경우 복용(사용)하지

마시고 구입처에서 교환하시기 바랍니다.

제조사

Bausch & Lomb Incorporated

Tampa, FL 33637, USA(미국)

수입자

바슈롬싸우스아시아인크(영업소)

서울시 강남구 테헤란로98길 8

KT&G 코스모대치타워 13층